Epreuves sur dossiers du CAPES externe de mathématiques, 3e concours 2019

Thème: probabilités

L'exercice

À Florence au début du XVII^e siècle, un jeu consistait à jeter trois dés et à miser sur le résultat de la somme des trois dés. Durant sa jeunesse Cosme II de Médicis, grand-duc de Toscane, a observé de nombreuses parties : il a remarqué qu'il était préférable de miser sur le nombre 10.

Un de ses fidèles disciples lui affirma : « Maître excusez-moi de vous contredire mais le 9 apparaît plus souvent que le 10 ». Lequel des deux a raison?

Les productions de deux élèves de seconde

Élève 1

J'ai réalisé une feuille de tableur et j'ai tenté de modéliser la situation. Je remarque que le 10 apparaît plus souvent même si parfois c'est le 9.

	Α	В	С	D	E	F	G
1	Dé 1	Dé 2	Dé 3	Somme			
2	2	1	6	9		Apparition du 9	Apparition du 10
3	4	4	2	10		22	18
4	2	2	6	10			
5	4	6	6	16		Testé avec 200	essais
6	1	5	5	11			
7	6	5	3	14			

Élève 2

J'ai compté les différentes façons d'obtenir 9 avec 3 dés. Il y en a 6. Puis j'ai fait le même raisonnement avec 10 il y en a 6 différentes également. J'en déduis que la probabilité de voir apparaître 9 sur la somme des dés est la même que celle de voir apparaître 10.

Donc aucun des deux n'a raison.

- 1 Analyser les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs. Vous préciserez l'aide que vous pourriez leur apporter.
- 2 Présenter une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de seconde.
- 3 Proposer deux exercices sur le thème *probabilités*, un au niveau du collège et un au niveau du lycée. L'un des exercices devra notamment permettre de travailler la compétence « modéliser ».

Thème: conjecture et démonstration

L'exercice

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 4n - 6$ pour tout entier naturel n. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n, et démontrer cette conjecture.

Les réponses de deux élèves de terminale scientifique

Élève 1

J'ai utilisé le tableur pour calculer de u_0 jusqu'à u_{10} .

Je vois que le diagramme obtenu correspond à une parabole. En considérant le sommet de la parabole, je vois que $\alpha = 2$ et $\beta = -3$, donc je fais l'hypothèse que $u_n = (n-2)^2 - 3$.

J'ai essayé de le prouver par récurrence mais je n'arrive pas à prouver l'hérédité et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas.

Élève 2

D'après l'énoncé on peut écrire que $u_{n+1} - u_n = 4n - 6$.

Donc la suite $u_{n+1} - u_n$ est une suite arithmétique de raison 4.

Donc si on ajoute les termes de la suite on obtient $u_{n+1} - u_0 = (n+1) \frac{-6+4n-6}{2} = 2n^2 - 4n - 6$.

Je peux en déduire que $u_n = 5 + 2(n+1)^2 - 4(n+1) - 6 = 2n^2 - 3$.

- 1 Analyser les productions de ces élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs éventuelles. Vous préciserez l'accompagnement que vous pouvez leur proposer.
- 2 Présenter une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique.
- 3 Proposer deux exercices sur le thème *conjecture et démonstration*, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée. L'un des exercices devra notamment permettre de développer la compétence « modéliser ».

Thème: géométrie plane


L'exercice

ABCDEF est un hexagone régulier d'aire 230 cm². Les points G, H, I, J, K et L sont les milieux respectifs des segments [AB], [BC],... et [FA]. Déterminer l'aire du polygone GHIJKL.

Les productions de deux élèves de troisième

Élève 1

À l'aide de GeoGebra, j'ai construit l'hexagone régulier ABCDEF en choisissant une longueur de côté quelconque. J'ai ensuite placé les milieux G, H, I, J, K et L des segments [AB], [BC], ... et [FA].



J'ai ensuite demandé au logiciel l'aire des deux polygones. L'aire de ABCDEF est égale à $33,81 \text{ cm}^2$ et l'aire de GHIJKL est égale à $25,36 \text{ cm}^2$.

$$\frac{33,81}{25,36} \approx 1,33.$$

Donc en revenant aux hexagones de l'énoncé, si ABCDEF a pour aire 230 cm², alors on peut déterminer l'aire de GHIJKL par le calcul :

$$230 \div 1,33 \approx 172,93.$$

L'aire du polygone GHIJKL est à peu près égale à 172,93 cm².

Élène 2

Le grand hexagone est un agrandissement du petit hexagone.

J'ai essayé de calculer le rapport entre les côtés du petit et du grand mais je n'y arrive pas.

- 1 Analyser les réponses de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs. Vous préciserez, en particulier, les aides qui pourraient leur être apportées.
- 2 Présenter une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de troisième.
- 3 Proposer deux exercices, un au niveau du lycée et un au niveau du collège, sur le thème *géométrie plane* permettant notamment de développer la compétence « chercher ».

Thème: problèmes conduisant à la résolution d'équations

L'exercice

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{\iota}, \vec{\jmath})$.

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = (x-1)e^{1-x}$ et \mathscr{C} sa courbe représentative dans ce repère. La courbe \mathscr{C} admet-elle des tangentes passant par l'origine O du repère?


Les productions de trois élèves de terminale scientifique

Élève 1

J'ai tracé la courbe avec GeoGebra.

J'ai trouvé une tangente qui passe par l'origine du repère. Son équation est y = 0,2x.

Donc la réponse est oui.



Élève 2

Équation de la tangente : y = f'(a)(x - a) + f(a).

J'ai calculé f(0) = -e et f'(0) = 2e, ce qui donne y = 2ex - e.

Cette droite ne passe pas par l'origine du repère donc la réponse est non.

Élève 3

$$f(x) = (x-1)e^{1-x} \ donc \ f'(x) = (1) \times (-e^{1-x}).$$

L'équation y = mx + p de la tangente est : $y = -e^{1-a}(x-a) + (a-1)e^{1-a}$.

$$p = 0 \iff ae^{1-a} + (a-1)e^{1-a} = 0 \iff a = 0, 5.$$

Il y a une seule tangente qui passe par O.

- 1 Analyser les démarches de ces trois élèves en mettant en évidence leurs réussites, leurs éventuelles erreurs et l'accompagnement que vous pourriez leur proposer.
- 2 Présenter une correction de cet exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique.
- 3 Proposer deux exercices sur le thème *problèmes conduisant à la résolution d'équations* dont l'un au moins nécessitera une prise d'initiative.

Thème: arithmétique

L'exercice

On dispose de billets de 5 € et de billets de 20 €. De combien de façons peut-on obtenir la somme de 165 € ?

Les productions de trois élèves de terminale S spécialité mathématiques

Élève 1

Soit x le nombre de billets de $5 \in$ et y celui de billets de $20 \in$. On a 5x + 20y = 165. Comme x et y sont des entiers positifs, on a $20y \le 165$ donc y est compris entre 0 et 8. Il y a donc 8 façons d'obtenir $165 \in$.

Élève 2

J'ai utilisé un tableur pour trouver les nombres de billets de 5 € et 20 €.

G12 ▼ : × ✓ f _x									
A	Α	В	С	D	E				
1	у	20y	reste	Х					
2	1	20	145	29					
3	2	40	125	25					
4	3	60	105	21					
5	4	80	85	17					
6	5	100	65	13					
7	6	120	45	9					
8	7	140	25	5					
9	8	160	5	1					
10									

Élève 3

J'appelle x le nombre de billets de 5 € et y le nombre de billets de 20 €. Je dois donc résoudre 5x + 20y = 165. C'est une droite, il y a une infinité de solutions.

- 1 Analyser les productions de ces trois élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs. Vous préciserez l'accompagnement que vous pouvez leur proposer.
- 2 Présenter une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique spécialité mathématiques.
- 3 Proposer deux exercices sur le thème *arithmétique*, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée. L'un d'entre eux permettra notamment de travailler la compétence « communiquer ».